

## TÂCHES QUOTIDIENNES LIÉES AU DIABÈTE

HEURE	Repas et collation	Vérification de la glycémie	Insuline	Commentaires

Utilisez ces abréviations pour indiquer le type de soutien nécessaire (s'il y a lieu) pour accomplir les diverses tâches :  
**A** – Assistance nécessaire; **S** – Supervision nécessaire; **I** – Indépendance (autonomie)

**EMPLACEMENT DE LA (DES) TROUSSE(S) D'URGENCE :** \_\_\_\_\_

### HYPOGLYCÉMIE LÉGÈRE (glucose trop bas) : Vérifier, traiter, recommencer

Si la glycémie est inférieure à 4 mmol/L : Traiter et vérifier de nouveau la glycémie au bout de dix à 15 minutes.

Traiter de nouveau si la glycémie demeure inférieure à 4 mmol/L.

Traiter et recommencer ce cycle jusqu'à ce que la glycémie atteigne au moins 4 mmol/L.

#### Symptômes habituels d'hypoglycémie de l'élève

- Tremblements     Maux de tête     Irritabilité ou morosité
- Faim                 Pâleur                 Faiblesse et fatigue
- Confusion         Autre \_\_\_\_\_

#### Traitement

- \_\_\_\_\_ comprimés de glucose
- \_\_\_\_\_ verre de jus, boisson gazeuse ordinaire
- \_\_\_\_\_ Skittles
- Autre \_\_\_\_\_

#### HYPERGLYCÉMIE (taux de sucre élevé)

Appeler un parent ou un tuteur si la glycémie est supérieure à \_\_\_\_\_ mmol/L ou si l'élève ne se sent pas bien.

Si l'élève a une pompe, lui administrer une dose de correction et vérifier ses cétones lorsque sa glycémie dépasse \_\_\_\_\_ mmol/L.

- Appeler un parent.                                 Voir le plan de soins personnalisé, en page \_\_\_\_.

Directives particulières : \_\_\_\_\_

*Cette feuille donne un aperçu des tâches QUOTIDIENNES liées au diabète que doit effectuer l'élève. Conservez-en une copie à portée de la main dans les cours auxquels l'élève assiste, même si celui-ci s'occupe de la plupart de ses soins lui-même. Consultez le plan de soins complet pour en savoir plus, particulièrement dans des situations inhabituelles.*